

OOAS-Fr

Merci beaucoup de répondre aux questions suivantes qui portent sur la façon dont vous géreriez une overdose d'opioïdes ou opiacés qui surviendrait devant vous (exemple d'opioïde ou opiacés: héroïne, méthadone, morphine, oxycodone, tramadol, fentanyl or codéine).

Avant de commencer à répondre, merci de lire les définitions suivantes :

Overdose aux opioïdes: difficultés à respirer, peau devant bleue, perte de conscience, impossibilité de réveiller, survenant après une prise d'opioïdes (exemple d'opioïde: héroïne, méthadone, morphine, oxycodone, tramadol, fentanyl or codéine).

Naloxone: c'est un médicament (un genre d'antidote aux opioïdes) qui est souvent utilisé par les services de secours pour annuler les effets d'une overdose aux opioïdes et ramener la personne à la conscience.

Continuez 

Veillez noter dans quelle mesure vous êtes d'accord avec chaque phrase ci-dessous:	Absolument pas d'accord	Pas d'accord	Indécis	D'accord	Absolument d'accord
1. J'ai déjà assez d'information sur comment gérer une overdose	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Je sais déjà comment injecter de la naloxone à quelqu'un qui fait overdose	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Je saurais comment vérifier si quelqu'un qui fait une overdose respire convenablement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. J'aurais peur, si je donne de la naloxone, que la personne devienne agressive ensuite	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Si quelqu'un fait une overdose, je voudrais être capable de pouvoir l'aider	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. J'aurais peur de faire une erreur en cas d'overdose chez quelqu'un	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Je serais réticent à utiliser la naloxone de peur de provoquer un syndrome de sevrage	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Toute personne susceptible d'assister à une overdose devrait avoir de la naloxone à disposition	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Je ne pourrais pas être spectateur en cas d'overdose, je me sentirais obligé de faire quelque chose	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. En cas d'overdose, j'appellerais une ambulance, mais je ne souhaiterais pas faire plus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. J'aurai besoin de plus de formation avant que je me sente suffisamment confiant pour aider quelqu'un qui fait une overdose	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12. Je saurais comment faire du bouche-à-bouche à quelqu'un qui fait une overdose	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13. La famille et les proches des usagers de drogues devraient être prêts à faire face à une overdose	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14. Je saurais faire un massage cardiaque à quelqu'un qui fait une overdose	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15. Ca me gênerait d'appeler les secours car la police pourrait venir aussi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Continuez 

Veillez noter dans quelle mesure vous êtes d'accord avec chaque phrase ci-dessous:	Absolument pas d'accord	Pas d'accord	Indécis	D'accord	Absolument d'accord
16. Si j'essaie d'aider quelqu'un en overdose, je risque de lui faire du mal sans le vouloir	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17. Si je suis témoin d'une overdose, j'appelle une ambulance immédiatement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18. J'aurais peur de me blesser avec l'aiguille de la seringue si je dois injecter de la naloxone	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19. Si j'assiste à une overdose, je me sentirais en panique et ne serais pas capable d'aider	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20. Si quelqu'un fait une overdose, je saurais quoi faire pour l'aider	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21. Je sais comment mettre quelqu'un qui fait une overdose en position de sécurité	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22. Je resterais avec la victime d'une overdose jusqu'à ce que des secours arrivent	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23. Je préférerais ne pas aider quelqu'un qui fait une overdose car je ne veux pas me sentir responsable s'il meurt	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24. Je connais très peu de choses sur comment aider quelqu'un qui fait une overdose	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25. Les aiguilles m'effraient et je ne serais pas capable de faire une injection de naloxone	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
26. Je sais comment gérer correctement une overdose	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
27. Si je voyais une overdose, je serais nerveux, mais je ferais quand même le nécessaire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
28. Je ferai tout ce qu'il faut pour sauver la vie de quelqu'un qui fait une overdose	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Cette échelle a été développée et validée par Anna Williams, John Strang, et John Marsden, (Addictions Department, Institute of Psychiatry and Psychology and Neuroscience, King's College Londres). Les propriétés psychométriques de l'échelle ont été testé et publiée dans Williams AV, Strang J & Marsden J (2013). Development of Opioid Overdose Knowledge (OOKS) and Attitudes (OOAS) Scales for take-home naloxone training evaluation. *Drug Alcohol Dependence* 2013; 132(1-2):383-6. Contact: anna.v.williams@kcl.ac.uk ou annaw06@gmail.com.

Validation française: Laconi S, Palma-Alvarez RF, Stöver H, Padberg C, Jamin D, Merouch F, Chappuy M, Roncero C, Rolland B. Validation of the Opioid Overdose Knowledge (OOKS) and Attitudes (OOAS) Scales in French, Spanish, and German Languages, among a Sample of Opioid Users. *Eur Addict Res.* 2021 Mar 3:1-6. Contact: benjamin.rolland@univ-lyon1.fr